

A close-up photograph of a branch with several bright yellow flowers in bloom. The flowers have multiple petals and prominent stamens. The background is dark and out of focus, highlighting the vibrant yellow of the flowers. The branch is thin and brown, with some buds visible.

BISO
JICA

**QUY TRÌNH SỬ DỤNG
ENZYME BISO CHO MAI
VÀNG TRONG 1 NĂM**

Giảm thuốc hóa học – hướng đến canh tác hữu cơ an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng, giúp cây phát triển tự nhiên, khỏe mạnh. Đồng thời kích thích chồi – lá – hoa mọc đều, cân đối, tăng đề kháng với nấm bệnh và thời tiết bất lợi. Nên kết hợp ủ phân theo quy trình Nhật Bản (Biso Jica) để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả cho bà con nông dân.

NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ

Enzyme hữu cơ Biso:

- Daichi No Tomo
- Daichi No Tomo 500
- Mikata 1000
- SP 10-15-20
- Mikata 3000



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Giai Đoạn 1: Pha men ủ Sau Tết - Phục hồi và phát triển tán (Tháng 1 - 3 Âm lịch)

- Mục tiêu: Giúp cây phục hồi sau khi ra hoa, nảy chồi – đâm tược khỏe.
- Tưới gốc Daichi No Tomo + Daichi No Tomo 500.
- Phun Mikata 1000 có thể bổ sung Daichi No Tomo (phòng trị nấm bệnh) trên lá.
- Tần suất: 10 ngày/lần (tháng đầu tiên) sau giãn dần 20 - 30 ngày/lần.
- Kết hợp: Bổ sung thêm SP 10-15-20 cho lần tưới thứ 2 hoặc thứ 3.

*Sản phẩm có thể diệt và ngừa tuyến trùng. Năng nóng cần thêm Kali bổ trợ cây.



Giai Đoạn 2: Nuôi cành - tạo bộ lá hoàn chỉnh (Tháng 4 - 6 Âm lịch)

- Mục tiêu: Tăng cường dinh dưỡng để nuôi cành tán, hạn chế ra hoa sớm.
- Tưới gốc Daichi No Tomo + Daichi No Tomo 500 → Tăng hoặc giảm Daichi No Tomo 500 theo hiện trạng cây.
- Có thể kết hợp phân hóa học (NPK 16.16.8 hay 30.10.13) tùy theo hiện trạng của cây để thúc đẩy tăng trưởng (hòa tan chung với Daichi No Tomo 500 để chuyển hóa thành dạng dễ tiêu cho cây hấp thụ) → thức ăn sống thành thức ăn chín.
- Phun lá Mikata 1000 kết hợp Daichi No Tomo.
- Tần suất: 15 - 20 ngày/lần.

*Hạn chế lân - kali trong giai đoạn này để chặn phân hóa mầm hoa sớm, canh nước là yếu tố quan trọng nhất cho giai đoạn này (đặc biệt không siết nước).



Giai Đoạn 3: Tạo nụ hoa - thúc phân hóa mầm hoa (Tháng 7 – 9 Âm lịch)

- Mục tiêu: Kích thích cây phân hóa mầm hoa đồng đều, khỏe mạnh.
- Tưới hoặc phun Enzyme NPK 10-15-20 hữu cơ + Daichi No Tomo, kết hợp phun lá Mikata 1000

Tần suất: 20-30 ngày/lần.

*Tưới gốc: Dùng Enzyme Biso để nuôi rễ, hỗ trợ vận chuyển dinh dưỡng. Tía canh và canh nước tùy từng vườn.

Giai Đoạn 4: Dưỡng nụ - chuẩn bị xử lý ra hoa (Tháng 10 – 12 Âm lịch)

- Mục tiêu: Nuôi nụ to, đều, khỏe – chuẩn bị xử lý ra hoa đúng Tết.
- Tưới Daichi No Tomo – Daichi No Tomo 500 tùy vào thời tiết và dinh dưỡng để bổ sung SP 10-15-20.
- Tần suất: 20-30 ngày/lần.

*Hạn chế đạm.

Giai Đoạn 5: Xử lý ra hoa – trở hoa đúng Tết

- Mục tiêu: Hỗ trợ dinh dưỡng giúp cây tăng bung nụ – nở hoa, màu sắc rực rỡ và kéo dài tuổi thọ của bông, thời gian đúng dịp Tết bằng Mikata 3000.
- Trước Tết âm lịch từ 20-30 ngày (giai đoạn nhật lá): Tưới Mikata 3000 (phân hóa mầm hoa) 10 ngày/lần → rất quan trọng.



THAM GIA CỘNG ĐỒNG



Mikata 1000 có thể kết hợp với các sản phẩm có gốc sinh học (Dầu neem, Nano đồng, Nano bạc, Abamectin) tăng khả năng hiệu quả hơn trong việc xử lý sâu bệnh.

QUY TRÌNH TÙY THUỘC VÀO KINH NGHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI, THỜI TIẾT TỪNG VÙNG VÀ KỸ THUẬT MỖI VƯỜN KHÁC NHAU, NÊN THEO DÕI VỚI CÁC NHÀ VƯỜN UY TÍN ĐỂ CÂN ĐỐI HIỆN TRẠNG VÀ LƯỢNG NƯỚC TƯỚI PHÙ HỢP.

***QUY TRÌNH TRÊN CHỈ ÁP DỤNG DÀNH CHO MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM.**

